

OPERASJON AV FISTEL/ABSCESS I ENDETARMEN

Ved analfistel eller analabscess har det dannet seg et hulrom eller en kanal ved analåpningen. For å bli kvitt væsning og infeksjoner må pusshulen åpnes og kanalen spaltes og skjæres ut. Resultatet blir et åpent sår som tilheler i løpet av noen uker.

FØR OPERASJONEN

Behandlingsdagen må du være fastende.

Faste betyr at du de siste 6 timene før operasjonen:

- Ikke kan spise
- Ikke drikke melkeprodukter eller juice
- Ikke røyke eller snuse
- Ikke bruke tyggegummi, drops eller lignende

Du kan imidlertid drikke litt vann/soft inntil 2 timer før møtetidspunktet.

NB! Dersom du ikke har fulgt reglene for faste de siste 6 timene før operasjonen, kan vi ikke under noen omstendighet operere deg, og operasjonen må dessverre avlyses!

Tømming:

Endetarmen må tømmes med et klyster om morgenen. Kjøp Klyx 240 ml på apotek.

Smertelindring:

Du skal ta Paracet 500 mg 3 tabletter 2 timer før møtetidspunktet.

OM OPERASJONEN

Utføres i lokalbedøvelse med avslappende medisiner, eller kortvarig narkose.

Fistel/abscessen blir spaltet og du vil få et åpent sår. Ut fra størrelsen på såret, vil videre behandling avtales.

Ved alle kirurgiske inngrep er det en liten risiko for komplikasjoner, som blodansamling, blodpropp eller infeksjon. Dette inntreffer imidlertid svært sjelden.

ETTER OPERASJONEN

- Du ligger til observasjon i noen timer.
- Du får et lett måltid.
- Dersom du blir operert sent på dag eller operasjonen er stor, kan det bli nødvendig å overnatte. Ta derfor med faste medisiner. Utreise etter frokost.
- Legen vil skrive ut sykemelding 1-3 uker og resept etter behov.