

OPERASJON FOR HÆMORRHOIDER

Hæmorrhoider er egentlig åreknuter i analkanalen og deles inn i ytre og indre hæmorrhoider etter lokalisasjon. Indre hæmorrhoider kan behandles med gummistrikk mens ytre hæmorrhoider klippes/skjæres/brennes bort i lokalbedøvelse eller kort narkose. Marisker, som er hudfliker og rester etter ytre hæmorrhoider, behandles som det siste. Det etterlates et åpent sår som vil gro spontant i løpet av noen uker.

FØR OPERASJONEN

Behandlingsdagen må du være fastende.

Faste betyr at du de siste 6 timene før operasjonen:

- Ikke kan spise
- Ikke drikke melkeprodukter eller juice
- Ikke røyke eller snuse
- Ikke bruke tyggegummi, drops eller lignende

Du kan imidlertid drikke litt vann/saft inntil 2 timer før møtetidspunktet.

NB! Dersom du ikke har fulgt reglene for faste de siste 6 timene før operasjonen, kan vi ikke under noen omstendighet operere deg, og operasjonen må dessverre avlyses!

Tømming:

Endetarmen må tømmes med et klyster om morgenen. Kjøp Klyx 240 ml på apotek.

Smertelindring:

Du skal ta Paracet 500 mg 3 tabletter 2 timer før møtetidspunktet.

OM OPERASJONEN

- Utføres i lokalbedøvelse med avslappende medisiner eller narkose.
- Det blir et åpent sår.
- Ved alle kirurgiske inngrep er det en liten risiko for komplikasjoner, som blodansamling, blodpropp eller infeksjon. Dette inntreffer imidlertid svært sjelden.

ETTER OPERASJONEN

- Du ligger til observasjon i noen timer.
- Du får et lett måltid.
- Ut fra operasjonens omfang eller hvis du opereres sent på dagen, kan det bli nødvendig å overnatte. Ta derfor med faste medisiner. Utreise etter frokost.
- Du vil få et informasjonsskriv angående videre behandlingsopplegg.
- Legen vil skrive ut sykemelding 1-3 uker og resept etter behov.