

OPERASJON FOR SPREKK I ENDETARM (ANALFISSUR)

Analfissur er et kronisk sår i analkanalen, ofte ledsaget av en stram lukkemuskel.

FØR OPERASJONEN

Behandlingsdagen må du være fastende.

Faste betyr at du de siste 6 timene før operasjonen:

- Ikke kan spise
- Ikke drikke melkeprodukter eller juice
- Ikke røyke eller snuse
- Ikke bruke tyggegummi, drops eller lignende

Du kan imidlertid drikke litt vann/saft inntil 2 timer før møtetidspunktet.

NB! Dersom du ikke har fulgt reglene for faste de siste 6 timene før operasjonen, kan vi ikke under noen omstendighet operere deg, og operasjonen må dessverre avlyses!

Tømming:

Endetarmen må tømmes med et klyster om morgenen. Kjøp Klyx 240 ml på apotek.

Smertelindring:

Du skal ta Paracet 500 mg 3 tabletter 2 timer før møtetidspunktet.

OPERASJONEN:

- Utføres i kortvarig narkose.
- Såret skjæres bort og indre lukkemuskel utvides ved et lite snitt eller manuell strekk. Det blir et lite sår som gror spontant i løpet av noen uker.
- Ved alle kirurgiske inngrep er det en liten risiko for komplikasjoner, som blodansamling, blodpropp eller infeksjon. Dette inntreffer imidlertid svært sjelden.

ETTER OPERASJONEN

- Du ligger til observasjon i noen timer.
- Du får et lett måltid.
- Ut fra operasjonens omfang eller hvis du opereres sent på dagen, kan det bli nødvendig å overnatte. Ta derfor med faste medisiner. Hjemreise etter frokost.
- Legen vil skrive ut sykemelding 1-2 uker og resept etter behov.