

OPERASJON FOR TRANG FORHUD (PHIMOSE)

Phimose betyr at forhuden ikke kan trekkes helt eller delvis tilbake, slik at hele penishodet (glans) blir synlig. Dette kan gi opphav til infeksjoner og smerter.

FØR OPERASJONEN

Operasjonen utføres i lokalbedøvelse. Dersom du ønsker det kan du få medisiner som gjør at du slapper av, men da må du være fastende. Du kan ikke kjøre selv når du skal hjem fra sykehuset, du må bli hentet.

Faste:

Faste betyr at du de siste 6 timene før operasjonen:

- Ikke kan spise
- Ikke drikke melkeprodukter eller juice
- Ikke røyke eller snuse
- Ikke bruke tyggegummi, drops eller lignende

Du kan imidlertid drikke litt vann/saft inntil 2 timer før møtetidspunktet.

NB! Dersom du ikke har fulgt reglene for faste de siste 6 timene før operasjonen, kan vi ikke gi deg avslappende medisiner!

Smertelindring:

Du skal ta Paracet 500 mg 3 tabletter 2 timer før møtetidspunktet.

OPERASJONEN

Ut fra hvor store plager du har, blir det bestemt hva som må gjøres. Vi prøver å fjerne minst mulig av forhuden. I noen tilfeller spaltes bare en trang ring, men det kan også være nødvendig å fjerne en del av forhuden (omskjæring).

Ved alle kirurgiske inngrep er det en liten risiko for komplikasjoner, som blodansamling, blodpropp eller infeksjon. Dette inntreffer imidlertid svært sjelden.

ETTER OPERASJONEN

- Uten avslappende medisin kan du reise hjem rett etter operasjonen.
- Med avslappende medisin blir du liggende her en stund til observasjon.
- Da får du et lett måltid før hjemreise.
- Du får et informasjonsskriv om hvordan du skal forholde deg etter operasjonen.
- Sykemelding gis vanligvis ikke.